


۶-۱۲-۹۳
2 AFFAR

گلے کے غدود پر صحت جانا

مؤلفہ و مرتبہ

ڈاکٹر ریاض علی راجپوت

بے۔ ڈی۔ ایم۔ ایس۔ ڈی۔ ایم۔ (انڈیا)۔ ایم۔ بی۔ ایچ۔ اے (لندن)



ناشر

ہومیوپیتھک ڈاکٹر

راجپوت اینڈ کمپنی بازار حاجی پورہ اندرون سوئیکار نوگیٹ گوبرنوالہ

قیمت : ۶ روپے

بیش لفظ

ایک معروف ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اکثر ایسے متکبر مریضوں اور لواحقین سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جن کو ان کے ڈاکٹروں نے جلد از جلد بچوں کے ٹالسٹز کے آپریشن کرانے کا مشورہ دیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک عام آدمی بغیر آپریشن علاج کو ترجیح دیتا ہے۔

ایک ہومیوپیتھ مریض کے مزاج کے مطابق علاج کرتا ہے۔ نہ کہ اس کے پاس کوئی تسک نہ دوا ہوتی ہے۔ اس علاج سے نہ صرف ٹالسٹز شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بلکہ چھوٹے بچے ٹھوڑی لمبا طے سے بھی عمدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اکثر ٹھنڈا گنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور انہیں کھانسی۔ پھینکیں۔ وقت تنفس اور لاتعداد دیگر تکالیف سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ جن کا ٹالسٹز سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔

ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت

ٹانسلز لف بافت پر مشتمل ہوتا ہے جو کگلے کے داخلہ کے مقام پر ایک چوکیدار کی طرح کام کرتا ہے۔ تاکہ کسی بھی قسم کی عفونت منہ کے اندر داخل ہو کر پیچھے ٹول میں نہ جا سکے۔ اگر ٹانسلز کو سوزش ہو جائے۔ یا عفونت سے متاثر ہو جائیں۔ یا ٹانسلز بڑھ جائیں تو اس سے نہ صرف بعض اوقات ناک بند ہو جاتی ہے۔ بلکہ سانس بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ علاج حضرات اس سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے فوراً ٹانسلز کٹوانے کا مشورہ دے ڈالتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟۔ اکثر اوقات ٹانسلز کٹوانے سے سانس آسانی سے آنے لگتا ہے۔ گلے کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اور وہ کچھ یا بڑا جو اکثر زکام اور کھانسی میں مبتلا رہتا ہے پہلے سے بہتری محسوس کرتا ہے۔ لیکن والدین کی مایوسی اس وقت قابلِ دید ہوتی ہے جب کچھ عرصہ بعد اسی طرح زکام دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ گلا خراب اور کھانسی لوٹ آتی ہے۔ بعد ازاں دہشت ناک نوبت آ پہنچتی ہے۔

اس حالت میں والدین ہو میو پیٹھی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان سے سوال کیا جاسکتا ہے۔ اگر ٹانسلز کی وجہ سے یہ تمام کالیف تھیں۔ تو انہیں کٹوانے کے بعد اب کس چیز کو کٹوائیں گے جتنی ٹانسلز کی وجہ سے یہ تمام کالیف نہیں تھیں۔ بلکہ مریض کی مزاجی حالت ایسی تھی۔ جس کی وجہ سے ٹانسلز بڑھ گئے۔ اور ٹانسلز بڑھ جانے سے دیگر علامات پیدا ہوئیں۔ ہو میو پیٹھی مزاجی کالیف کا سادہ طریقہ سے علاج کرتی ہے۔ اور مریض کی مدد کرتی ہے۔ کہ اس کی تکلیف سے چھٹکارا حاصل

کر سکے ۔

میڈیکل اٹھارٹیز کی ایک کثیر تعداد ٹانسڈ نکال دینے کے خلاف تنبیہ کرتی ہے اور موجودہ دور میں ماڈرن سرجن بھی اس کے خلاف ہیں ۔
اپریشن کے بعد ان بچوں پر عجیب جان لیوا خوف طاری ہو جاتا ہے ۔
ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ہی فوراً چیخنا چلنا شروع کر دیتے ہیں ۔ اور یہ خوف معمولی کالیف کے لئے بھی اتنا شدید ہوتا ہے ۔ جس سے وہ رات کو بستر پر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ اکثر رات کو خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں ۔ جب کہ ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے مریض بڑے دوست اور خوش باش ہوتے ہیں
ٹانسڈ کے بڑھ جانے سے اکثر بہرہ پن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کان اور حلق کی خدیمانی نالی کی جھلیوں کے نقص اور ناک کے پچھلے حصے کے غدودوں کی وجہ سے بھی بہرہ پن ہو جاتا ہے ۔ لہذا جسم سے ٹانسڈ کو نکال باہر کرنا ۔ ایسے بہرہ پن کے کیسوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔

میں دیہاں پر چنایک ماہرین کی آراء پیش کرتا ہوں ۔
ڈاکٹر جلیں ڈیوس ایم ۔ بی ، ایف آر سی ۔ پی ایک مشہور میڈیکل میگزین " دمی پریکٹسز " اپریل ۱۹۴۹ء میں لکھتے ہیں ۔
" میں و مہ واے مریضوں کے ٹانسڈز اور ناک کے پچھلے حصہ کے غدود کو نکال باہر کرتے کے خلاف تنبیہ کرتا ہوں ۔ جس سے کوئی

فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر اوقات لگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور دواؤں کے
 بے دریغ استعمال سے جیسا کہ اسپرین اور پیرا سٹامول کے خلاف ہوں
 جس سے اکثر کیسوں میں شدید برا نکائش ہو جاتا ہے۔
 ڈاکٹر پی۔ ایل اوگرا ایسوسی ایٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس سٹیٹ
 یونیورسٹی آف نیویارک لکھتے ہیں کہ ٹانسز کو کاٹ کر بھینک دینا اکثر
 اذقات بچوں کو پولیو کے حملہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی۔
 دردناک بیماری جس سے بچہ ساری عمر کے لئے لاغر ہو جاتا ہے۔
 ڈاکٹر اوگرا کا کہنا ہے کہ اس نے ۵۰ بچوں کا مشاہدہ کیا ہے
 جن کے ٹانسز کاٹ دیئے گئے تھے۔ ان تمام میں جزوی یا مکمل طور پر
 انٹی باڈیز کی کمی تھی جو کہ وائرس کی چھوت جیسا کہ پولیو سے ملافت
 کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک ٹانسز کے نکال دینے سے انسانی جسم
 میں انٹی باڈیز کی کمی ہو جاتی ہے۔ جس سے چھوت لگ جانے کا
 خطرہ رہتا ہے۔

ڈاکٹر اوگرا جس کی تحقیقات اس سال امریکن پیڈیاٹرک
 سوسائٹی کی میٹنگ میں پیش کی گئیں۔ اب وہ بوفیلو نیویارک
 اسٹیٹ میں بچوں کی بیمار لوں پر ریسرچ کر رہے ہیں جہاں وہ
 اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر آف مائیکروبائیولوجی
 ہیں۔

ڈاکٹر اوگرا کا کہنا ہے کہ پولیو کے کیس ان بچوں میں عام ہیں

اگر ہم بڑھے ہوئے ٹانسز کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے بڑھنے کی وجوہات تلاش کرنا پڑیں گی۔ اگر ہم ہومیوپیتھک ادویات سے بڑھے ہوئے ٹانسز کا کامیاب علاج چاہتے ہیں۔ تو ہمیں صرف ٹانسز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بڑھنے کی مزاجی وجہ تلاش کرنا ہوگی۔ جو کہ اس بیماری کی حقیقی وجہ ہے۔ جسے اپریشن سے دور نہیں کیا جاسکتا۔ وہ معالج جو صرف ٹانسز کو تندرست رکھنے ہوئے علاج معالجہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ زیادہ تر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اپریشن کرانے کا مشورہ دے ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ٹانسز جیم کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ جس کا اپنا ایک مقام اور مقصد ہے جبکہ اپریشن کی اہمیت پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ کسی مناسب وجہ سے کیا جا رہا ہو۔ اپریشن اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جبکہ ٹانسز اتنے بڑھ جائیں جس سے زندگی خطرہ میں ہو اور ادویات سے افادہ نہ ہو رہا ہو۔

”ایسے مریض مرض کی ابتداء میں نہیں آتے۔ جدید ادویات انجکشن۔ ویکسین کا وسیع علاج کر اگر آخر کار جب والدین کو تنہا ہوتا ہے۔ کہ اب اس کا علاج صرف سرجری ہے۔ تب جا کر ایسے مریض ہومیوپیتھ سے مشورہ کرتے ہیں یہاں علاج مزاجی کیفیت کی بنیاد پر ہوگا۔ مریض کی اور اس کے والدین کی تفصیلی ہسٹری دوا تجویز کرنے میں راہنمائی کرے گی۔ ڈاکٹر وادیا۔“

علامات : آواز کا بھاری ہو جانا۔ آواز دار تنفس، سماعت میں کمی۔ کھانسی جس کے ساتھ پیپ دار بلغم۔ سوتے میں منہ کھلا رکھنا اور نیند کے دوران خراٹے۔

وجوہات : ۱۔ سرخ بخار اور ڈفٹھیریا کی وبار۔ ۲۔ انفلوئنزا کی وبار۔ ۳۔ جوڑوں کا بخار، مضر صحت گیس میں سانس لینا۔ ۴۔ چوڑے ۶۔ باضمہ کی خرابی، ۷۔ پاؤں کا پسینہ دب جانا۔ ۵۔ حرارت کی اچانک تبدیلی۔ ۹۔ الرجی۔ ۱۰۔ دانتوں کا انفکشن، ۱۱۔ عمر ۶ ماہ تا ۱۰ سال ۱۲۔ ٹانسز کی سوزش کا بار بار حملہ۔

پیشہ گیاں : ٹانسز کے مستقل طور پر خرابی سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور ساتھ ہی یہ دل کی مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کانوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے اسکی وجہ سے کانوں میں درد یا پیپ کا بہنا ہو سکتا ہے اس سے خاص کربچوں میں کان بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ٹانسز گلے میں دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم کا گیٹ وے ہے جب یہ گندے ہو جاتے ہیں تو ہر چیز جو گلے سے گزرے گی وہ گندی ہو کر گزرے گی اور تمام جسم کو متاثر کرے گی بچوں میں خاص طور پر قد کا بڑھنا رک جاتا ہے اور نشوونما متاثر ہوتی ہے اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے جو ممتورم ہو جاتے ہیں۔

علاج

۱، : ایکونائٹ : کسی خاص دوا کی خصوصی علامات کی عدم موجودگی میں، میں ہمیشہ ٹانسلز کی سورشس کا علاج ایکونائٹ اور فائٹوڈیکا سے کرتا ہوں۔ (ڈاکٹر والٹر سپنڈیلر)۔

۲، ایس : زبان سوجی ہوئی۔ ٹھنڈ سے درد کو افاقہ دہی ہو رہا، ڈرائیسی بغیر پائس دمنہ،

۳، اسٹیگو : مریض اکثر گلے کی سورشس میں مبتلا ہو۔ خاص طور پر بایاں ٹانسلز۔ نکلنے سے درد میں شدت۔ (چودھری)

۴، آرم میٹ : جب بچہ کی نشوونما متاثر ہو۔ پانچ سال کا بچہ تین سال لگے۔ خبیثے اوپر چڑھے ہوئے۔ ناک کی غدود بڑھی ہوئی۔ ناک سے بدبودار اخراج مگلے کے غدود ٹانسلز کے ساتھ ساتھ کان میں درد۔ اور کان سے مواد بہے۔

۵، امونیم میور : ٹھنڈ لگ جانے سے ٹانسلز کی سورشس۔ نکلنا اور منہ کھولنا دشوار ہو۔ بات نہ کر سکے۔ (ہورتی)

۶، بیسلینم (۲۰۰)، ہفتہ کے بعد ایک خوراک ڈاکٹر واڈیا کا کہنا ہے میں نے بار بار مشاہدہ کیا ہے کہ بیسلینم ۲۰۰ - ۱۴ - ۱۰M - اور اعلیٰ طاقتوں کی اکثر ضرورت رہتی ہے۔ جیسا کہ پرنٹ کا کہنا ہے اس طرح مکمل شفا حاصل کی جا سکتی ہے یہ دوا نہ صرف ٹانسلز اور

غدد کو افاقہ دیتی ہے۔ بلکہ پرانا تزلزلہ بزم کام۔ ناک اگلہ اور چھاتی کے متعلقہ دیگر امراض کو بھی شفا بخشتی ہے: "تیدق کار حجان۔
(۷) بیلا ڈونا: زیادہ تر ابتدائی حالت۔ تیز بخار۔ اجملع خون۔
دائیں طرف کے ٹانسلز اور حلیں ہو۔ ٹانسلز بڑھے ہوئے ہنگنے میں
وقت۔ خاص طور پر سرخ بخار کے حملہ کے بعد۔

(۸) بریٹیا کارب: ڈاکٹر برنٹ کا کہنا ہے کہ بریٹیا کارب ٹانسلز
کی سب سے بڑی دوا ہے لیکن جب ٹانسلز بار بار حفاظتی
ٹیکے لگنے سے ہوں تو تھو جا۔ سلیشیا استعمال کرنی چاہیے۔ اسی
طرح جب تیدق کار حجان سو۔ تو پہلے سیلینم استعمال کرائیں
پھر بریٹیا کارب دیں۔

ڈاکٹر ڈی ایم بورلینڈ کا کہنا ہے۔ بریٹیا میور کو بریٹیا کارب سے
قبل ٹانسلز کی حاد سوزش میں استعمال کرنا مفید ہے۔ اور
اکثر اوقات سوراٹینم کی ایک خوراک کی ضرورت ہوگی۔ بریٹیا کارب
کا مریض ذہنی اور جسمانی طور پر پسماندہ ہوگا۔ بچہ شرمیلہ ہوگا
بھونچلنے کی عادت ہوگی۔ اپنے سبق پر توجہ نہیں دے سکتا
اکثر ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔

(۹) بریٹیا آسو ڈائیڈ: بریٹیا کارب سے زیادہ بہتر دوا ہے (لوگس)
(۱۰) برومیم: ٹانسلز کی سوجن۔ ٹانسلز گہرے سرخ اور سوجے
ہوئے۔ (ٹائیلر)

(۱۱) ٹیوبر کو لائنم : جب گلے میں دکھن ہو : تو اس دوا کو ہمیشہ یاد رکھیں : مور ہنزر ، .

بچوں کی سب سے بڑی دوا : جس کی اکثر ضرورت پڑتی ہے ۔
(فرج وڈ)

جن بچوں کو آسانی سے ٹھنڈ لگ جائے (رابرٹ لٹاؤل وڈ) ،
(۱۲) : رسٹاکس : جب مریض حملہ کے دوران جوڑوں کی دردیں محسوس کرے ۔ سرد مشروب سے زیادتی محسوس کرے (بلن)

(۱۳) سلفر : جب کوئی واضح علامات موجود نہ ہوں تو میں سلفر ۳۰ ایک ماہ تک دیتا ہوں ۔

پنی ایل نبتھاک حاد اذیات کے بعد یا مختصر عرصہ تک کام کرنے والی اذیات کے بعد اور ٹانسز کی سوزش کے بعد کھڑکی کے لئے مقید ہے (شیفرڈ) مزاجی دوا ہے ۔

(۱۴) فاسٹولیکا : ٹانسز سوجھے ہوئے : نکلنے سے درد کان کی طرف جاتے ۔ گرم مشروبات سے حد میں اضافہ ۔

(۱۵) کالی یا ٹیکرویم : ترابان پر زرد تہہ اور گلے کی دکھن ۔ (ایب)

(۱۶) کالی میور : سوزش کی ابتدائی علامات کے بعد (نیش)

(۱۷) کلکیریا آئیوڈائیڈ : جب بریٹا کارب اور ٹیوبر کو لینم تا کام ہو جائے ۔ تخم سراسر بڑے غدد بڑھے ہوئے ۔

(۱۸) کلکیریا کارب : ٹانسز کی سوجھن جب گلے تو محسوس ہو ۔ گلابیت

اور تنگ ہے۔ خناییری مزاج۔

(۱۹) کاکیر یا فلور: ٹانسلز کو سکر تی ہے (بوگر)،

(۲۰) کلکیر یا فاس: اپریش سے بچاتی ہے، مومن حالت: کثرت سے استعمال ہونے والی دوا۔

(۲۱) کیومبلا: اگرچہ یہ دوا ٹانسلز میں استعمال نہیں ہوتی۔ لیکن ڈاکٹر کینٹ جب درد گرمی سے بہتر ہو۔ اور در دیں کانوں کی طرف جائیں، تجویز کرتے ہیں۔

(۲۲) لائیکوپوڈیم: دائیں سے بائیں سوجن ہو۔

(۲۳) لیکیس: ٹانسلز کی سوجن بائیں طرف سے شروع ہو۔ اور دائیں طرف

جائے۔ در دیں گرم مشروبات سے بڑھ جائیں۔ تیندے کے بعد علامات

میں زیادتی۔ (نیش)

(۲۴) لیک کین: دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں۔ درد کو سرد یا گرم

مشروب نگلنے سے افاقہ۔ (شیفرڈ)

(۲۵) مرک بن آئیوڈائیڈ: بائیں طرف۔

(۲۶) مرک پرڈو آئیوڈائیڈ: دائیں طرف (ریب) گرم مشروب سے اضافہ

(شیفرڈ)

(۲۷) مرک سال: سردی سے گلے بڑھ جائیں۔ ٹانسلز پر سفید نشان۔

نواب کی زیادتی۔ منہ سے بدبو۔ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش۔ اور رت

کو تکلیف بڑھ جائے۔

(۲۸) ہائیڈراسٹس: تمام حالتوں میں غاروں کے لئے بہتر دوا ہے۔
 (آر۔ ٹی۔ بیسی)

(۲۹) ہپیئر سلف: سرد مزاج۔ گلے میں کسی چیز کے اٹکنے کا احساس نہ لگنے
 سے تکلیف۔ جو کان کی طرف جائے۔ گرم چیزوں سے آفاقہ۔
 غیر عمدہ کیسوں میں۔ بیلا ڈونا۔ مرک سال۔ ہپیئر سلف کی ترتیب دار
 دے سکتے ہیں

اپریشن کے بعد کی ادویات

سفر: نوزتین کے اخراج کے بعد کی تکالیف کی عمدہ دوا
 کلکیر کا رب: اپریشن کے بعد ناک کے پچھلے حصے کے نزلہ اور ہوائی
 نالیوں کی سوزش وغیرہ
 کیلنڈولا: اپریشن کے بعد کھانے کے لئے دیں۔ اور غارے بھی کرائیں
 سٹریپٹوکس ۲۰۰: کئی ماہ تک دیں۔

ریپرٹری

وائس طرف: آرٹنک سلف۔ ریویرس۔ بیلا ڈونا۔ مرک سال۔
 مرک آئیوڈائیڈ۔ فلیوس۔ فاسٹولیکا۔ لائیوڈیم۔
 وائس طرف: ڈیفیٹیو مائیں: ایک مائیں۔ مرک سائٹیم۔

ہائیں طرف : ایل نامیٹریٹ لیکس ۔ مرک اسٹوڈائیڈ پورس ۔
سلفر ۔

ہائیں ڈیفیریٹ کے بعد : لیکس
ہائیں سے دائیں : لیکس ۔

ٹانسلز کی تکلیف کے ساتھ بخار اور منہ سے بدبو : مرکال
سٹریٹو کوسن

ٹانسلز کی تکلیف کے ساتھ پرہیز اور کان و حلق کی بندش : مرکال
نختم : امونیا کارب ۔

زکام : آرٹنگ ۔ اسٹوڈائیڈ

خشکی اور حلق کا احساس : فاسفورس ۔

کھانسی اور ٹھنڈ لگ جانا : میسلیم ۔

گلے میں درد : پیرسلفر ۔ مرک سال ۔

لیکس ۔ لائیکوپوریم

گلے میں خشکی : فائو لیکا ۔

ناک سے آواز نکلنے : ٹانی سکیریا ۔

خسرو کے بعد ٹانسلز کی تکلیف : برومیم ۔

زکام کے بعد : سیاڈیلا ۔

حاد حلق کی سورشس : مابا ۔

مرین زرخہ : مرک سلیٹم ۔

درودل میں ٹانگہ کی تکلیف : آرٹھک - اگنیشیا - مرکال -
 ڈفٹھریا - - - : آیو و نیم - جلیسیم - کرٹولیس - لائیکو پوڈیم
 ایک کین - ایکس - مرک سائٹرم -
 نیرٹم آرس -

سرخ بخار میں ٹانگہ کی تکلیف : ایس
 کروپ - - - : فاسفورس -
 افاقہ ٹھنڈے مشروب سے : ایس - مرک سال
 گرم مشروب سے : لائیکو پوڈیم - پیپر سلفر -
 اضافہ گرم مشروب سے : ایکس -
 منہ کھولنے سے : کلیریا فاس -
 بہرہ پن ہو جائے : نائٹرک ایڈ
 - - - بچوں میں : کالی بائیکروم -
 کلا تقریباً بند ہو جائے : ایک کین
 گلے میں بلغم کا احساس سلسل : کلیریا فلوور
 منہ سے سانس لے : مرک آیو ریورس
 نکلنا مشکل ہو : ایک کین - نائٹرک ایڈ

مزمن سب سے اہم ادویات : برٹاکارب - لائیکو پوڈیم - ایکس -
 دیگر ادویات : برٹامیور - پٹرولیم - سٹینٹا - فائوٹیکا
 فیرم - نائٹرک ایڈ - نیرٹم میور -